

## Symptômes

- Rougeur circulaire en forme de cible autour de la morsure.
- Fatigue, fièvre, douleurs musculaires et articulaires.
- Sans traitement, elle peut causer des atteintes neurologiques et cardiaques.

## Comment retirer une tique en toute sécurité

1. Utiliser un « tire-tique » (disponible en pharmacie ou à la clinique vétérinaire),
2. Saisir la tique au plus près de la peau,
3. Tourner doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,
4. S'assurer que la tique a été retirée en entier,
5. Désinfecter la zone avec de l'alcool modifié ou un antiseptique à base de chlorhexidine, d'hexamidine ou de povidone iodée,
6. Surveiller les symptômes dans les semaines suivantes,

**Afin d'empêcher la propagation de bactéries dans le sang, merci de respecter les règles suivantes :**

- **Ne pas arracher la tique avec les doigts !**
- **Ne pas utiliser :**

D'alcool, de flamme, d'éther, d'huile, de savon ou d'autres produits.

## Les tiques à pattes noires

(*Ixodes Scapularis*) appelées aussi « tiques du cerf », sont des parasites qui se nourrissent de sang.

## Transmission de la maladie

Elles représentent un risque important pour la santé humaine et animale car elle peuvent transmettre plusieurs maladies graves, dont la maladie de Lyme causée par la bactérie *Borrelia burgdorfei* (transmission après une morsure prolongée > 24h).

## Cycle de vie en 4 stades


**Œuf (printemps)** : une femelle adulte pond entre 1 500 et 3 000 œufs après s'être nourrie.

**Larve (été)** : Presque microscopique, elle cherche un premier hôte, généralement un petit mammifère ou un oiseau.

**Nymphes (printemps/été)** : c'est à ce stade que la tique est la plus dangereuse pour les humains, car elle est très petite et peut transmettre des maladies sans être détectée.

**Adulte (automne)** : les femelles cherchent un hôte (cerf, chien, chat, humain) pour un dernier repas avant de pondre leurs œufs et mourir.

# TIQUES À PATTES NOIRES, UN DANGER SILENCIEUX !



Les tiques sont invisibles,  
mais les risques sont réels

## SOYEZ VIGILANT ET PROTÉGEZ-VOUS !

# Chiens, chats, enfants, parents... Les tiques ne font pas la différence !

## Prévention

- Vêtements longs et clairs,
- Répulsifs, huiles essentielles (menthe, lavande),
- Rentrer les bas de pantalon dans les chaussettes ou porter des bottes/chaussures hautes,
- Éviter les herbes hautes et les sous-bois,
- Douche après chaque sortie en nature,
- Inspection régulière du corps,
- Vérifier les animaux domestiques.

## Protection des animaux

- Produits ou médicaments anti-tiques,
- Brossage et inspection.



## Que faire après une morsure de tique ?

- Noter la date de la morsure,
- Surveiller l'apparition d'une rougeur circulaire et d'autres symptômes,
- Consulter un médecin immédiatement en cas de symptômes. Un traitement antibiotique précoce est essentiel pour prévenir de la maladie de Lyme.

Nous vous conseillons de conserver la tique dans un pot avec de l'alcool à 70° au réfrigérateur, puis de l'amener à la DTAM au SAEEB à Saint-Pierre ou à l'antenne de la DTAM à Miquelon afin d'enrichir notre base de données.

**Pour plus d'informations :**  
[sante.gouv.fr/maladie-de-lyme](http://sante.gouv.fr/maladie-de-lyme)

## Apparence selon le temps d'alimentation de la tique

Non-nourri 24h 36h 72h 7 jours



## Les tiques ne sautent pas, ne volent pas, elles pratiquent la "quête"

Elles attendent patiemment sur un brin d'herbe ou une branche basse, les pattes en avant tendues, pour s'accrocher à un hôte passant à proximité.

## Où trouve-t-on les tiques ?

Les zones de prédilection des tiques sont :

- Les forêts (surtout les lisières),
- Les herbes hautes,
- Les bords de sentiers,
- Les jardins boisés.

Localement, la première des préventions pour éviter les invasions de pestes (tiques, mais aussi puces et puces de parquet) serait de les anticiper en protégeant les larmiers et aération de l'installation d'étourneaux.

